


## modo de empleo

## contenido pack



2x15 ml Abamectina 1,8%  
o  
1x250 ml Abamectiva 1,8%



12 o 100 unds.  
conector estandar  
(opcional)



12 o 100 unds.  
Ynject®


## utensilios necesarios (no se incluyen)




jeringa  
dosificadora



broca metal  
6'5 mm diámetro  
y 10-15 cm longitud



vaso  
medidor




taladro



martillo de nylon  
o goma

## instrucciones de dosificación




Verter directamente el contenido de la botella de Abamectina en el vaso medidor.



Cargar la jeringa desde el vaso medidor con 2,5 ml de Abamectina.


Abamectina 1,8% EC p/v

Dosis: 2,5 ml/Ynject



Sujetando firmemente la jeringa, acoplar su boquilla en el orificio de entrada de Ynject, dejando que el contenido de la botella rellene completamente la jeringa, para facilitar la mezcla de la abamectina, y empujar el émbolo para introducir el volumen total de líquido dentro de la botella.


## instrucciones de aplicación



Con la ayuda de un taladro y la broca recomendada, realizar los orificios necesarios en el tronco del árbol (1 cada 20-25cm de perímetro) homogéneamente repartidos alrededor del tronco y a la altura del pecho.

Los orificios deben tener entre 8 y 10cms de profundidad y una inclinación según indica la figura.

Insertar un conector en cada uno de los orificios, con la ayuda de un martillo hasta que quede perfectamente ajustado.



Conectar la botella, ya cargada con la Abamectina, al conector a través del orificio de entrada de Ynject, girandola hacia arriba hasta que quede perfectamente ajustada.